PLAP

ĶN VĶTRO DĶYAGNOSTĶK

KULLANIM AMACI : V¿cut dākētē bb´ tekhis

Bu ¿r¿n Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmık, parafine gº m¿lm¿к doku kesitleri ile ākē mikroskobu ile gº r¿nt¿lenecek kalitatif imm¿nohistokimya i- in tasarlanmāktā r.

AÇIKLAMA :
PLAP, testis germ h¿creli t¿mº rlerin tanēmlanmasēnda faydalēdē r.

KATALOG NO : PL734

PL734-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
PL734-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
PL734-1	1 ML KONS. 1/500 5000 TEST
PL734-0,1	0,1 ML KONS. 1/500 500 TEST

BOYANMASI GEREKEN ALAN : H¿cre zarē

POZİTİF KONTROL : Plaseta veya seminom

AMBALAJ : 7 ml Kullanēma Hazē r (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid i- eren seyreltilmık 7 ml antikor.)

KAYNAK : Fare

KLON : 8A9

ANTİKOR KONSANTRASYONU : Bilinmeyen

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan Diğerleri bilinmiyor.

EPİTOP Belirlenmedi

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ¿r¿n steril deĵ ildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmık doku bº l¿mlerinin boyanmasē, doku bº l¿mlerinin kaynayan 10 mM sitrat. pH 6.0, i- inde 10-20 dk muamele edilmesini ve ardēndan oda sēcaklē ēnda 20 dakika soĵ utulmasēnēgerektirir.

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : Oda sēcaklē ēnda 30 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma - ok a- āksa, daha d¿к¿k seyreltme veya daha uzun s¿re kullanē n. Eĵ er boyanma - ok g¿- l¿yse, º n ıklemi kontrol edin, daha y¿ksek seyreltme veya daha kēsa s¿re kullanē n.

SAKLAMA VE STABİLİTESİ : Bu ¿r¿n sodyum azid i- erir ve 2-8ÁC'de saklandē ēnda 24 ay stabildir. ¦ r¿n etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayēnēz. Reaktif º nerildiĵ i кekilde saklanmazsa, performans kullanēcētarafēndan doĵ rulanmalēdē r.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletikime ge- in

P R O S P E K T ¦