CD3

ĶN VĶTRO DĶYAGNOSTĶK

KULLANIM AMACI : V¿cut dākētābb´ teкhis

Bu ¿r¿n Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiк, parafine gº m¿lm¿к doku kesitleri ile ākāk mikroskobu ile gº r¿nt¿lenecek kalitatif imm¿nohistokimya i- in tasarlanmāktā. Tavкan Monoklonaldir.

AÇIKLAMA : Bu antikor, T hücreleri tarafından ifade edilen CD3 antijeninin intrasitoplazmik kısmı ile reaksiyona girer. Timusun hem korteksinde hem de medullasēnda ve periferik lenfoid dokularda insan T h¿crelerini boyar. Bu antikor, formalinle sabitlenmiк, parafine gº m¿l¿ dokularda normal ve neoplastik T h¿crelerinin boyanmasēi- in uygundur.

KATALOG NO : PL9107

PL9107-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
PL9107-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
PL9107-1	1 ML KONS. 1/150 1500 TEST
PL9107-0,1	0,1 ML KONS. 1/150 150 TEST

BOYANMASI GEREKEN ALAN : H¿cre zarē

POZİTİF KONTROL : Timus hücreleri, bademcik

AMBALAJ : 7 ml Kullanēma Hazē (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid i- eren seyreltilmiк 7 ml antikor.)

KAYNAK : Tavкan

KLON : SP7

ANTİKOR KONSANTRASYONU : Bilinmiyor

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan Diğerleri test edilmedi.

EPİTOP : 156-168aa

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril deĵ ildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmiк doku bº l¿mlerinin boyanmasē, doku bº l¿mlerinin kaynayan 10 mM sitrat, pH 6.0, i- inde 10-20 dk muamele edilmesini ve ardēndan oda sēaklē ēnda 20 dakika soĵ utulmasēnēgerektirir.

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYONU : Oda sēcaklē ēnda 30 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma - ok a- āksa, daha d¿к¿k seyreltme veya daha uzun s¿re kullanēn.
Eĵ er boyanma - ok g¿- l¿yse, º n iklemi kontrol edin, daha y¿ksek seyreltme veya daha kēsa s¿re kullanēn.

SAKLAMA VE STABİLİTESİ : Bu ¿r¿n sodyum azid i- erir ve 2-8ÁC'de saklandē ēnda 24 ay stabildir. ¦ r¿n etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayēnēz. Reaktif º nerildiĵ i кekilde saklanmazsa, performans kullanēcētarafēndan doĵ rulanmalēdē.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletiкime ge- in